

Beskrivelse
over
Norske Insecter.
Andet Stykke.
ved
Hans Strom.

INSECTA COLEOPTERA. Hele Vin-
gedækkede Insecter.

SCARABÆUS.

- 1.) **S**carabæus (Auratus) muticus auratus, segmento abdominis secundo lateribus unidentato. Linn. Syst. Nat. Edit. X. No. 52. Er et temmelig stort, bredt og ophojet, Insect, hvis Hoved endes med et bredt, plat og foran tvært afskaaret, Tryne, forsynet paa begge Sider med en lille ophojet Kant. Dens forte Hølhorne, der sidde tæt neden for Øinene, endes med et temmelig stort og ovalt Leed, adskilt i tre ovale Blade. Hals-Skioldet (Thorax) er foran smalt, men bagtil bredt, med et temmelig stort Skild, eller trekantet Spidse, som
U s gaaer

gaaer hen imellem Bingedækkerne (Elytra), hvilke ere ophoiede oventil, og paa yderste Side noget indstaarne. Neden under har den, foruden det ophoiede Bryst, sex Bug-Skiel, af hvilke det foreste gaaer paa Siderne mere spids ud hen til Bagdelen, end de andre. Fodernes Laar ere temmelig tykke, og Skinnebenene (helst paa de foreste) foran glatte, men paa bageste Side taggede. Hals-Skioldet, saavelsom Bingedækkerne, ere meget fint puncterede og smukt grønne. Neden under er den derimod Violet, og derhos lodden, belynderlig paa det ophoiede Bryst-Stykke og Laarenes underste Side.

2.) Scarabæus (Atro-rubens) Corpore subeylindrico, atro-rubente† (*). Er maades lig stor og cylindrisk af Skabning. Hovedet er foran ovalt, men bagtil næsten tvært, med en udstaende Spidse i hvert Hørne. Tølhornene ere forte, og

(*) Dette Legn tilkiendegiver, hvor det findes, enten at Insectet er nyt, eller og at jeg i Hr. Linnæi Skrifter ei har fundet finde det; hvorved ikke nægtes, at jo nogle saadanne, ved usiere Undersogning, maastee kan findes beskrevne, enten i hans eller andres sildigere udkomne Skrifter.

og i Enden adskilte i tre Grene. Hals-Skioldet er foran noget indstaaret, og bagtil lidet ovalt, ellers oven til convex og glat, ligesom Hovedet. Bin-gedækkerne har ti ikke meget fiendelige Striber paa langs. Laarene ere tykke, Skinnebenene neden til brede, og paa yderste Side forsynede med tre Tagger, men paa den inderste ikkun med een, som sidder i Enden. Den opholder sig i Jorden, og findes baade større og mindre: De større (uden Tvivl Hunnerne) ere oven til sorte, men neden under sort-røde; de mindre ere derimod sort-røde baade over og under. See Tab. XVI. Fig. I. (*)

3.) Scarabæus (Fasciatus) muticus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. No. 47. Hovedet og Hals-Skioldet er overalt besat med graa op-reiste Haar. Bugen og Fodderne have og lige saadanne Haar, men lysere. Bin-gedækkerne ere langt kortere end Bag-delen

(*) Denne kunde være Scarabæus Fossor Linn., hvis den havde haft de tre Knuder paa Hovedet, som samme tillegges; dog da, jeg af Atlas Danicæ Tom I. p. 665. seer, at disse Knuder ikke altid skal være lige fiendelige, saa kan den maaske være en Art-Forandring deraf.

delen, og gule med tre sorte Eværbaand, af hvilket det middelste er afbrudt i Midten. Stiller man sig derimod Grunden for som sort, maatte den tillegges to gule Eværbaand, der i Midten løber sammen. See Fig. II.

- 4.) *Searabæus (Brunneus) muticus, rufo-testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto obsoleto.* Faun. Sv. Edit. 2. §. 396. Er af middelmaadig Størrelse, og af Skabning meget liig en Chrysomela. Munden seer ud som en flad, og foran lidt indskaaren, Spade med op-
hiede Kanter. Hølhornene ere i Enden deelte i tre smaa Grene. Hals-
Skoldet er for og bag næsten tvært, samt mere bredt end langt. Hver af Vingedeckerne have ti Striber, og Skinnebenene, som sædvanligt, hvæsse Tagger i Enden. Farven er overalt bleeg blod-rød og smudsig, undtagen Hovedets bageste Deel og Dinene, som ere sorte. Fundet paa Hassel-Erærenes Blade. See Fig. III.

HISTER.

- 5.) *Hister (Unicolor) totus ater, elytris substriatis.* No. I. (*). Er et fort, bredt, og bag

(*) Paa dette Indsect har jeg fundet mange smaa Acari, fastsiddende ved meget fine og stive Strænge, næsten

bagtil stumpet. Insect, hvis Hoved er meget lidet, og Folhornene smaa, med Kloder i Enden. Begge disse kan den, naar den vedrøres, skyde frem og trække til sig igien. Hals-Skioldet er temmelig bredt og overalt glat, med en op-hoiet Kant paa hver Side. Binge-dækkerne ere bag til roært affkaarne, oven til glatte og ligesom polerede, men
der-

næsten til Anseende som Knappenaale. De ere af Størrelse som de mindste Gnid, og ganske ovale, uden Forstiel paa Hoved og Stiert. Oventil ere de convexe, og rundt omkring omgivne med en lille Kant; neden under derimod opstiede som en lille Kiol, og samme-steds forsynede med fire Par Fodder, af hvilke det foreste Par sidder meget tæt sammen, men de estersølgende esterhaanden mere vidt fra hinanden. Strax oven for det øverste Par sees Legn til en lille udstaaende Mund, men ei til Folhorne. Farven er overalt rødbrun. Da jeg rev den løs, og lagde den under Microscopio, saae jeg den at gaae, trækende Kumper. Stilkken ester sig, men saa sagte, at det ei funde merkes med blotte Øine. Dette Insect ligner meesi det; Frisch har fundet siddende ester en Stræng eller Canal paa visse Scarabæis. See Beschreib. Insect. 4. Theil. §. 10. alene at samme forestilles uden Fodder. Hr. Linnæus, som melder derom Faun. svec. 2. §. 2284., er uvis, enten det skal kaldes en *Acarus Pediculus*, eller et Egg. Jeg mener, at det er en *Acarus*, hvortil Hr. Frischs iflun har været et Egg.

derhos subtilt stribede paa langs. Bagdelen er længer end Bingedækkerne, og hvor disse slipper, ligesom med tvende kraa Snit afkaaren. Farven er overalt sort og glindsende. See Fig. IV.

COCCINELLA.

- 6.) *Coccinella (2-Punctata) Coleoptris rubris: Punctis nigris duobus.* No. 2. Er et lis Det ovalt og ophøjet Insect, neden under sort, oven til paa Hals-Skoldet ligeledes sort, med to store hvide Pletter paa hver Side, og to smaa sammenføjede, saavel foran ved Hovedet, som bagtil. Bingedækkerne ere røde, med en sort Plet paa hver i midten.
- 7.) *Coccinella (13-Punctata) Coleoptris luteis: Punctis nigris tredecim.* No. 12. Omrent af samme Størrelse og Skabning. Hovedet og Hals-Skoldet ere mere eller mindre hvide og sortplette. Hals-Skoldet har især adskillige sorte Pletter, saasom to aflange i Midten, med en mindre imellem begge, foruden to mere runde der bagen for. Dog er disse Puncters Tall og Orden forskellig. Bingedækkerne ere guul-røde, med en lille sort Punct i det overste, som strækker sig til begge, dernæst een lige deraf paa

paa hver Side, saa tre sorte Puncter i Midten, lige over for hinanden. Hvor til kommer een Punkt paa hvert Vingedække hen ved Sammenførsen (Sutura Elytrorum), og en anden lige over for og yderst i Kanten. Bugen er sort og Fodderne rødbrunne. Fundet paa Hassel-Træ.

CHRY SOMELA.

- 8.) Chrysomela (Bi-lineata) viridi-aurea, thorace antice excavato, elytrorum linea duplii cærulea. Er et oval rundt og opphojet Insect, med et foran dybt indssaaret Hals-Skiold, uden kiendelige Side-Kanter. De fine Puncter, den øventil er bestroet med, ere for blotte Dine knap kiendelige. Farven er over til Guuld-grøn med to himmelblaas Linier paa Vingedækkerne. Bugen og Fodderne ere ligeledes guul-grønne, og Folhornenes foreste og største Deel bleeg. Den ligner meest Chrysomela ænea Linnæi, og kan maaßlee være en Art-Forandring deraf. See Fig. V.
- 9.) Chrysomela (Staphylæa) ovata obscure testacea tota. No. 17. Er ligeledes et ovalt, opphojet og noget større Insect, med kienelig opphiede Side-Kanter paa Hals-Skioldet. Farven er overalt blodrød, og

og alene Forfodernes underste Deel hvidagtig. Findes ofte under Stene paa Marken, og paa Græs-Arter nær ved Elvene.

- io.) *Chrysomela (qvadri-punctata) cylindrica*, thorace nigro elytris rubris: Punctis duobus nigris, antennis brevibus. No. 50. Er langagtig og cylindrisk, med korte Hørne, der paa den indvendige Side ere noget indstaarde, som en Sav. Hals-Skioldet er mere bredt end langt, ellers rundagtigt, og paa begge Sider forsynet med en lille ophøjet Kant. Bingedækkerne ere foran paa Siderne noget udstaende, derefter lidet indtrykte, ellers forsynede med fiendelige Side-Kanter, og nogle fine Striber paa langs. Farven er for største Delen sort, og neden under har den en hvidagtig Skier eller Glands; Men Bingedækkerne ere røde, med to sorte Pletter paa hver. See Fig VI. Den findes ofte paa Birke-Træe.
- ii.) *Chrylomela (Phellandrii) oblonga nigra*, thorace elytrisqve lineis duabus luteis. No. 69. Er et lidet smalt Insect, hvis Farve er sort og glindsende, med en gul Stripe paa hver Side af Hals-Skioldet, og

og tvende andre paa hver af Vingedeæf-
ferne, den ene i Midten og den anden i
yderste Kant, begge paa langs. Hals-
hornene ere fiendelig tykkere foran end
bagtil. Den findes ved Brønde.

CURCULIO.

12.) Curculio (Mollis) brevirostris, griseo-au-
ratus, nitens, femoribus muticis, elytris
mollibus. † Er maadelig stor, med en
kort og buttet Mund, som tilligemed
Hovedet er knap længer end Hals-Skiold-
det. Folhornene har tolv Leder, af
hvilke den første er længst og de fire sid-
ste tykkest. Vingedeæfferne, der ere
rynde og boielige som Papir, har ti
fiendelige Striber. Bugen er og tem-
melig blod. Laarene, som ere tykkest
nedentil, have paa den indvendige Si-
de ingen Tand, men fun Tegn til en
lille Knude. Det hele Insect har en
graa og rød-agtig Guldsarve, og synes
tillige under Microscopio at være besadt
med stride og forte Haar. See Fig.
VII. Findes i Mængde paa Birke-
Træer.

13.) Curculio (Fasciatus) brevirostris, griseo-
nitens, fasciis elytrorum undulatis ferru-
gineis. † Er knap halv saa stor som
Chr. Selsk. Skr. 4. D. X for-

forige, og omtrent af samme Skabning, med fort Mund, og uden Tænder paa Laarene. Folshornene ere af samme Bestaffenhed, men første Leed efter Proportion længere. Vingedækkerne ere haarde, af Farve mere eller mindre graa og skinnende, og har to eller tre brune og bolgagtige Evær-linier. Undertiden kan Vingedækkerne selv anses brune, og Eværlinierne graa-agtige. Findes paa Birke-Træe.

- 14.) Curculio (Lineatus) brevirostris griseus, thorace striis tribus pallidioribus. No. 67. Er knap større end en Loppe, med fort og bred Snude. Farven erstribevis graa og sort. Især ere disse Striber kiendelige paa Hals-Skioldet, som har een Stribe i Midten og twende andre paa Siderne. Hodder og Folshorne ere brunagtige. Findes i torre Bakker under Stene.
- 15.) Curculio (Longitudinalis) longirostris ater, abdomine ovali, femoribus muticis ferrugineis. † Er af Størrelse som en Linus, men smalere. Munden er næsten lige saa lang som Hovedet og Hals-Skioldet tilsammen, og disse tre Parter udgjøre den største Deel af Kroppen. Bag-

Bagdelen er siden og oval, og Vinges dækkerne stribede paa langs. Farven er overalt sort, men Laarene (der ere jevntykke uden Lænder) rodbrune. Findes under Stene paa Marken.

CERAMBYX.

16.) *Cerambyx (Ædilis) thorace spinoso: Punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis. No. 24.* Hals Skolet har paa begge Sider en ud staende Spidse, og ovenpaa fire gule Pletter, Bingedækkerne derimod paa yderste Side en udstaende Kant, oven for den nederste Side-Kant. Hunnen har bagtil en tyk Eg-Lægger Spidse, over og under bedækket med et Blad. Farven er mørk-graa, med et Par Toer baand af mørkere Farve over Bingedækkerne, som desuden ere besprengte med sorte Punkter. Det merkeligste ved dette Insect er Folhornene, hvis ti Leder ere alle sorte og hoide, og saa lange, at de hos Hannerne overgaaer Kroppens Længde fem à sep gange, (see Frisch. Beschreib. der Insect. Tom. XIII. pag. 18. Tab. XII.) men hos Hunnerne langt kortere, som sees Fig. VIII. Den har sit Eihold i Træe.

17.) *Cerambyx (Cursor) thorace spinoso, elytris obtusis rufis, margine lineaque nigris, antennis mediocribus.* No. 30. Er af Skabning som *Cerambyx inquisitor* (see første Stykke Fig. III.) Panden og de maadelig lange Følhorne ere røde. Hals-Skioldet har paa hver Side en udstaende Spidse; Vingedeckerne der imod et udstaende Horn foran, og ellers ovenpaa nogle ophoiede Linier paa langs, imellem hvilke formeres endel brede Striber, af hvilke den første er grønagtig mørk, den efterfolgende rød, og den yderste atter grønagtig, hvorpaa endelig folger Side-Kanten, som er rød. Fodderne ere røde, og Bugen rødagtig, med en lys skinnende Loddenhed.

CANTHARIS.

18.) *Cantharis (Litteralis) thorace marginato rufo, linea undulata inscripto, elytris testaceis.* † Er i sit Slags maadelig stor, med redagtige Følhorne og rodt Hoved, der bag til har en sort Breimme, som en Hals-Krave. Hals-Skioldet er plat rundagtigt, flad-Kantet, og ellers af rodt Farve, men i Midten merket med en sort belagtig Stræg, der ligner den latinste Bogstav M. Bagdelen er sort, men

men dens Side-Kanter bleeg-ssde. Vingedækkerne ere bløde og af Farve brune, ligesom Skinnebenene og Forfodderne; Baarene ere derimod sorte. Den kan maaske være en Art-Forandring af *Cantharis livida* Linnæi, og forestilles her Fig. IX.

- 19.) *Cantharis (Biguttata) thorace marginato atro, elytris nigris apice flavis.* No. 20. Er fun lidt større end en Loppe, og overalt sort, undtagen Vingedækernes yderste Spidse og Bagdelens Sider, som ere gule. Hals-Skoldet har rundt om en ophøjet Kant. Folhornene ere vel saa lange som Kroppen, og Vingedækkerne ei fuldt saa lange som Bagedelen.
- 20.) *Cantharis (Testacea) thorace marginato flavo macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusqvis lividis.* No. 22. an? Er omrent halv saa stor som Fig. og har et mere langagtigt og smalt Hals-Skold, der neden til er vel saa bredt, som oven til. Hovedet er sort, og Hals-Skoldet ligeledes, med rede Side-Kanter. Folhornene ere ved Roden rødagtige, og Vingedækkerne lysbrune, Bagedelen sort med brun Spidse,

og Fodderne brune; dog ere Laarene
undertiden sorte.

ELATER.

- 21.) Elater (*Castaneus*) thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore atro. No. 10. Er af sædvanlig Skabning og middelmaadig Størrelse. Følhornene ere paa indvendige Side grende, Hals-Skioldet Castanie-brunt og loddent, Wingedækkerne derimod rød-brune med sorte Spidser. Resten er sort.
- 22.) Elater (*Balteatus*) thorace atro, elytris ante dimidiato-rubris, corpore nigro. No. 13. Er lidet mindre, og af Farve ganske sort, undtagen Wingedækernes foreste halve Deel, som er rød, og giver den en god Anseelse.
- 23.) Elater (*Pectinicornis*) thorace elytrisqve æneis, antennis pectinatis. No. 22. Er temmelig stor, med Følhorne, som paa den indvendige Side ere indskærne som en Sav, ved det at Lederne paa den Side ere ulige bredere oven til end nedentil. Ellers er den overalt Kobberfarvet og skinnende, samt noget gron derhos;

hos; Men Hunnerne ere ei saa grønne,
og uden taggede Folhorne (*).

- 24.) Elater (Longitudinalis) atro-fuscus, antennis pectinatis, pedibus testaceis. † Er af samme Størrelse, men langt smalslere, og har Folhorne, som paa den indvendige Side ere indstaarne, ligesom paa næstforegaaende. Hals-Skioldet er fort, men Bagdelen lang og smal. Vingedeckerne meget fint stribede, og derhos puncterede, som best sees under Microscopio, hvor de indhulede Puncter viser sig baade i og imellem Striberne. Over den hele Krop sees lyse Haar, som ellers ikke for blotte Dine ere fiendelige. Farven er overalt sortegraar og glindsende, men Fodderne brune. See Fig. X.

DYTISCUS.

- 25.) Dytiscus (Marginalis) thorace elytrorumque margine flavis. No. 5. an? Er et stort bredt og plat Insect, hvis Hoved er sort, med endael ikke meget fiendelige røde Striber. Hals-Skioldet er sort

X 4

pg

(*) Denne har jeg seet parre sig saaledes, at Hannen lage paa Ryggen, vendende sin Stiert hen til Hunnens, der lage paa Maren.

og glat, men omkring Kanterne, især paa begge Sider, brunt og igjennemsigtigt. I Midten har det og en lysbrun Eter-Stræg. Bingedækkerne ere flade, sorte og glatte, med brunagtige Side-Kanter, der med sorte Puncter ere bestrodde. Det foreste Par Fodder har, foruden Laaret og efterfølgende Leed, et rundt Leed som en Skive, der indentil er indhuul og rundt om tagget; det efterfølgende Par har paa nederste Leed nogle Haar eller Frondser; det tredie Par er paa nederste Deel ligeledes flosset eller med Haar besadt paa yderste Side. Fodderne ere mestendeels brune, og Fol-hoenene meget fine. Den opholder sig i Sumper, og forestilles her Fig. XI.

- 26.) *Dytiscus (Ovalis) fuscus*, thorace pedibusque testaceis. † Er oval og temmelig ophøjet eller convex. Den har smaa forte Folhorne, bestaaende af ti Leder, og et ovalt Hoved, der fortil er brunt, men bagtil sort. Hals-Skioldet er over og under brunt; Bingedækkerne derimod mørk-graa med brunagtige Side-Kanter. Bugen er sort, men Fodderne brune. De foreste har ingen Skiver som den næst foregaaende; men de bageste ere ligeledes flossede paa udven-

udvendige Side og tykke, i Steden for de andre ere smale. Den opholder sig i Vand, og kan maaßee være *Dytiscus cinereus* Linnæi. See Fig. XII.

- 27.) *Dytiscus (Natator) ovatus glaber*, anten-nis capite brevioribus obtusis. No. 14. Er et lidet ovalt, blaa-agtig sort, og liger som poleret, Insect, med røde Fodder. Hohornene ere meget forte og jævn-tykke, Hovedet trekantet; Hals-Skioldet mere bredt end langt, med en Evær-striben i Midten; og Vingedællerne for-tere end Bagdelen, som begge ere kan-tede paa Siderne. De foreste Fod-der ere smale, men de to bageste Par tykke og i Enden flossede. Bagdelen endes med en blod og flostet Spidse af rod Farve. Den er bekjendt deraf, at den løber oven paa Vandet i en Cirkel; ellers kan den og gaae paa det Torre, og i saadan Tilstand leve længe. For Ly-deligheds Skyld har jeg Fig. XIII. fo-testillet den i overnaturlig Størrelse.

CARABUS.

- 28.) *Carabus (Leucophthalmus) apterus, elytris levibus: Striis obsoletis octonis.* No. 3. an? Den er i sit Slag temmelig stor, med otte fiendelige Furor paa hver af Vinges

dækkerne, ellers af sædvanlig Skabning, og af Farve ganske sort. Hr. Linnaeus regner den iblandt apteros; men jeg har aldrig fundet den uden Binger. Den er ellers her en af de almindeligste, og findes allevegne under Stene paa Marken.

- 29.) *Carabus (Violaceus) alatus*, elytris læviusculis nigris, margine aureo, thorace sub-violaceo. No. 6. Er noget større end den foregaaende, og bagtil mere spids end sædvanligt. Bingedækkerne have ingen Furer, men ere overalt fint puncterede. Farven er i Allmindelighed sort, men Hals-Skioldet og Bingedækernes Side-Ranter smuk violette.
- 30.) *Carabus (Mollis) subtus flavescens*, elytris molluscis. + Er $3\frac{1}{2}$ Linie lang, med et Hjert-agtigt Hals-Skiold, som, foruden en Fur i Midten, har flade Kanter paa Siderne, og bagtil en ligesaadan flad, og derhos puncteret, Kant. Bingedækkerne ere tynde og boielige som Papir, og have ei alene Striber, men og Puncter i Striberne, hvilket sidste er usædvanligt. Farven er paa Hoved og Hals sort, paa Bingedækkerne brun-

brun-agtig, men paa Bug, Fodder og Folhorne, guul-brun og smudsig.

31.) *Carabus (Atro-rufus) ater*, *subtus rufus*,
elytris mollibus. † Denne er to til tre
 Linier lang, og har et Hiertedannet
 Hals-Skiold, med en Fur i Midten
 og Indtrykkelser paa Siderne. Vin-
 gedækkerne ere fint stribede, samt blode
 og bøielige. Bugen er og blod. Far-
 ven er oventil sort eller rødsort, men
 neden under mørkerød, ligesom paa
 Fodder og Folhorne. Under Vin-
 gedækkerne sees kun ganske lidet Tegn
 til Vinger, saa at den kan regnes blandt
 apteros. I Henseende til de blode
 Vingdedækker ligner den meget foran-
 forte *Carabus mollis*, men har dog ikke,
 som samme, Puncter i Vingdedækkernes
 Striber.

32.) *Carabus (Rufescens) ater*, *subtus rufescens*,
elytris solidis. † Er dobbelt saa stor
 som den næst foregaaende, og har bre-
 dere Hals-Skiold. Vingdedækkerne ere
 haarde, og have dybe Furer eller Stri-
 ber i sig. Farven er paa denne mere
 begsort oventil, og mere sort-rød neden
 under, (ligesom og paa Fodder og Fol-
 horne) end paa den næst foregaaende.

STA-

STAPHYLINUS.

- 33.) Staphylinus (Marginatus) ater, elytris æncis, thoracis lateribus pedibusque ferrugineis. † Er 2½ Linie lang og i Skabning ganske lig Staphylinus politus, hvis Farve den har paa Bingedækkerne, der ere mørk-Røbberfarvede. Hals-Skioldet har og ligesaadanne ti Puncter som hin, og i samme Orden, men desuden rød-brune Side-Kanter. Fodderne ere og rødblune. Jeg har og fundet en anden, dobbelt saa stor, af selvsamme Bestaffenhed, og med brune Fodder, men ingen røde Kanter paa Hals-Skioldet. Begge opholder sig paa Boletus bovinus, og kan maa ske være Art-Forandringer af Staphylinus politus.
- 34.) Staphylinus (Latus) ater, elytris longis nigro-rufis. † Er en god Linie lang, men efter sin Længde meget bred. Dens Hoved og Hals-Skiold ere subtilt puneterede, og Bingedækkerne lange, saa de strække sig halvt ned paa Bagdelen. Farven er sort, men paa Bingedækkerne sort-rød, ligesom paa Fodderne. Opholder sig paa Boletus bovinus.

Jeg

Jeg har og fundet andre af samme Størrelse og Skabning, men noget adskilte i Farve, der oven til var sort-rød, men paa Bug og Hodder guulbrun. Vingedækkerne strækede sig mere end midt paa Bagdelen.

35.) *Staphylinus (Striatus) ater*, thorace punctato & striato. † Er kun $1\frac{1}{2}$ Linie lang, med jevnlyk Bagdeel, og overalt puncterede Hals-Skiold og Vingedækker. Hals-Skioldet har desuden tre Furer paa langs, med ophøiede Striber imellem. Farven er overalt sort og skinnende.

36.) *Staphylinus (Punctatus) atro-ceruleus*, femoribus testaceis. † Er henved to Linier lang og ganske smal. Tælhornene ere smaa og fine, men Hovedet temmelig bredt imod det smale Hals-Skiold, der midt paa er bredest. Vingedækkerne ere bredere, men sorte. Hele Insectet er blaa-agtig sort, samt overalt puncteret, men Hoddernes Baar altid noget rødbrune.

LEPIDOPTERA. Neel-Vingedede Insecter.

PHALÆNA.

37.) *Phakena Bombyx (Antiqua) elingvis, alis planiuseulis &c. femina aptera.* No. 37.
Hans

Hannen, som er vinget, har jeg ikke set, men vel den vingeløse Hun, som for sin usædvanlige Skabnings skyld forestilles her Fig. XIV. Den er kort og tyk, med tvende sorte og lidet ficerede Hølhorne, samt to smaa Læpper i Ste-
den for Vinger. Farven er graa-agtig og uanseelig. Dens Larva er en sort Orm, anseelig af sine rode Lak-far-
vede Knoppe omkring Kroppens Ringe,
og de mange, deels gule og hvide, deels sorte, Haar-Buster, den har for, bag og paa Siderne (*).

38.)

(*) Denne Orm fandt jeg i Mængde siddende paa Bladet og Blaabær-Blade, i Aaret 1762, da jeg tog Grene af begge Slags, og satte i Vin-
duet, for at føde den dermed. Jeg merkede da,
at den hælti aad Bladene af første Slags; men Natten efter krobb den bort og fandtes ikke mere.
Jeg tog derpaa en anden og lagde den i en Eskel,
med Kviste af begge Slags Træ; men igien
nem en lidet Nabning krobb den bort, og fand-
tes Dagen efter siddende paa vinduet; Folgelig
havde den gaaet hele Gulvet over, og op ad
Vejen. Jeg lagde den i Esken igien, og stop-
pede Hullset til, da den efter 14 Dage besand-
tes at have forvandlet sig til en sort Puppe,
som hængte under Laaget efter et guult Spind,
som syntes at være en Levning af dens gule
Haar-Buster. Da Puppen blev vel forvaret,
besandtes tre Uger efter, at den havde faaet et
Hull

- 38.) Phalæna Noctua (Pronuba) spirilingvis cristata, alis incumbentibus, griseis; infer. luteis: fascia atra submarginali. No. 87. Er en maadelig stor Matsfugl med Haarsfine Hølhorne, lodden Ryg og platsliggende Binger. De øverste Binger mørk-graa med to mørke Pletter, af hvilke den nederste er mere aflang; og den øverste mere rund, men begge omgivne med en lille lys Ring. De underste Binger ere derimod guulbrune, med et sort Tverbaand hen ved bageste Kant, og en lille sort krum Streng i Midten.
- 39.) Phal. Noctua (Lunula) spirilingvis cristata, alis deflexis atro-purpureis, nebulosis, lineola arcuata flava. + Hølhornene ere Haarsfine, den opruldede Turge dobbelt, Rygen lodden, og Farven overalt violet-sort med en temmelig Glands, og adskillige bolgagtige Tverlinier over Bingerne, af mørkere Farve. Omrent midt paa de øverste Binger, henved yderste Kant, sidder en lille krum Linie som en Halv-Maane

Hull i den tykke Ende, hvorfav var udskaben forebemeldte Phalæna femina. Hærend den dode, sadte den henved 160. Eg, som varer runde, glatte og hvide som Porcelain; Men paa øverste Side flade, med en guul Ring om Gladens Kant, og en guul Priske midt i Ringen.

Maane. Samme er guul, og har adskillige lidet fiendelige gule Puncter oven for sig, foruden eendeel næsten ukiendelige Puncter i yderste Kant af samme me Binger. De underste Binger ere lysere, samt bagtil fryndede med hvide Fryndser. See Fig. XV.

- 40.) Phal. Noctua (Variegata) spirilingvis cri-stata, alis deflexis, canis lineolis undula-tis transversalibus confluentibus. † Er af samme Skabning. Farven er over-alst hvid eller hvid-graa, med to kraa Streger af sort Farve over den lodne Ryg, og mange sorte Tvaerstrege over Bingerne, der ere meget bølgagtige og uordentlig i hinanden løbende. Af disse ere tre i Midten de fiendeligste, og for-enes midt paa Bingerne ved en sort firkantet Plet. Hen ved bageste Kant sidder mange sorte og trekantede Tæn-der, foruden andre mindre ved Frynd-serne. De underste Binger ere oventil graa, med nogle mørkere Striber, der strekker sig i to Grene hen til bageste Kant. See Fig XVI. Begge disse ere fundne paa Fyrre-Stokke.
- 41.) Phalæna Geometra (Lactaria) bipectini-cornis, alis angulatis albis, immaculatis, anten-

antennis apice setaceis. No. 127. Bor regnes blant de smaa, og er ganske hvid. Folhornene ere bagtil fryndede, men foran aldeles uden Fryndser.

42.) *Phalæna Geomet. (Vernaria) pectinicornis*, alis virescentibus: strigis duabus albis repandis, antennis apice setaceis. Faun. Svec. Edit. 2. §. 1227. Er siden og lys-grøn af Farve, med to hvide og bølgagtige Striber af hvid Farve over alle Vingerne. Neden under ere Vingerne lysere, og den yderste Kant paa de foreste brun. Hunnen har Haarsfine Folhorne, men Hannen Fryndser indtil midt paa Folhornene, da Resten er bar. Er almindelig nok i blandt Træerne.

43.) *Phalæna Geom. (Pulveraria) pectinicornis*, alis omnibus testaceis, fascia lata ferruginea: subtus purpurasceni ferrugineis. No. 141. Er temmelig stor, og oven til rødbrun, samt besprengt med mange fine Puncter. Paa de øverste Vinger har den et Jernfarvet, samt i bageste Kant noget ujævnt, Tverbaand, som og fortsettes paa underste Vingers indreste Kant, men ei til den yderste. Neden under ere alle Vingerne mere Erh. Selsk. Skr. 4. D. v. gunl-

guulifarvede end paa overste Side.
Folhornene ere siærede.

- 44.) Phalæna Geom. (*Bilineata*) seticornis alis omnibus luteis testaceo-undatis: fascia repanda, margine fusco alboque. No. 170. Er kun siden og ganse guul, med adskillige mørke Tverbaand, bestaaende af mange bolgagtige Tverlinier. Det første Baand sidder ved Bingernes Rød; det andet midt paa Bingernes, med en bolgagtig eller ujævn Kant. Dette middelste Baand er bredest, og i begge Kanter hvidagtigt. Imellem dette og Bingernes bageste, mørke Kant sidder endnu en bolgagtig Tverlinie, hvidagtig i bageste Kant. Bingernes Fryndser ere og hvidagtige.
- 45.) Phalæna Geom. (*Alchemillata*) seticornis, alis canescensibus: anticis undatis: fascia nivea cinereo-undata, lineolaque intra apicem. No. 179. Bor regnes blant de smaa. Farven er Afke-graa (paa endeeel rødagttig graa), med et hvidt bolgagtigt Tverbaand henved Slutningen af de overste Binger, hvilket igienemstieres ved en anden lille bolgagtig Linie af graa Farve. Imellem det hvide Tverbaand og Bingernes yderste Spidsse sidder en hvid og bolgagtig Stribe, som

som er ganske fort. Det hvide Eværbaand fiendes nogenledes paa underste Side, og under de bageste Vinger sidder ligeledes et lyst Eværbaand.

- 46.) *Phalæ Geom. (Funebris) seticornis*, alis atris, maculis albis: superioribus tribus, inferioribus duabus. + Er fun lidet, men anseelig af sin sorte og hvide Farve, der kan lignes ved en Sorge-Dragt. De øverste Vinger have, over og under, tre hvide Pletter, to store og een lidet; de underste derimod ikkun to, af hvilke den nederste er forenet med en hvid Linie, som gaaer jævnsides med Vingersnes yderste Kant. Ryggen har to merkelige gule Fiere oven til imellem Vingerne, og Bagdelen mange hvide Ringe. Tungen er brun, Følhornene Haar-fine, og Foddernes nederste og største Deel hvid. Vingersnes Fryndser ere og alle hvide. See Fig. XVII.

- 47.) *Phalæna seticornis spirilingvis*, corniculis duobus recurvis, basi cristatis alis plano-incubentibus. Faun. Svec. §. 887. item Edit. nov. §. 2294. Den har temmelig smale, plat-liggende og bagtil udskærne Vinger, stivhaarede Følhornes
Y 2 ne,

ne, en opruldet Tunge, og i Vandens to, hen til Nakken boiede, smaa Horne, som nedentil ere hakkede eller indskaerne. Vingerne har bagen til adskillige paa langs gaaende Furor, og ere af en mere eller mindre graa-agtig Farve, samt merkede med adskillige Puncter, nemlig nogle sorte strax oven for Fryndserne, og tre andre midt paa Vingerne, af hvilke den overste er sort, og bestaaer (naar noie tilsees) af to Puncter, men de andre nedenfor hvide. Paa Ryggen sidder en lodden Ophoieselse, og under Bagdelen sorte Puncter paa begge Sider (*).

- 48.) Phalæna Tinea (Pellionella) alis canis, medio puncto nigro, capite subgriseo. No. 254. Henhører til de saa kaldte Mell, med sammenruldede Vinger, og er funliden. I Vandens sidder tvende krumme Horne, foruden de temmelig lange og Haar-fine Folhorne. Vingerne ere bagtil noget ophoiede, og Fodderne tiornede. Farven er paa Hovedet guul-agtig,

(*) Den flyver omkring i Husene tilig om Foraaret, og kaldes Forvælde. I Hr. Linnæi nyeste Edition af Fauna Svec. loc. cit. hensøres den blant Seposita.

agtig, men ellers graa Solv-farvet, med en mørk Plet paa øverste Vinger, sidende ei fuldt i Midten, men noget hen til Bagdelen. Holder til i Klæder, og fortærer samme.

- 49.) *Phalaena Tinea (Tessella) alis nigris, fasciis duabus albis remotissimis tessellatis.* No. 263. Er temmelig stor og fladagtig, med sort-brune Vinger, hvorover gaaer to hvide Eværbaand, det eene fortil og det andet bagtil. I samme hvide Eværbaand sees nogle smaa sorte Puncter.
- 50.) *Phalaena Tinnea (Xylostella) alis cinereis: vitta dorsali communi alba dentata.* No. 265. Er graa-agtig, med en, langs ad Ryggen paa begge Vingerne Sneehvid, og paa begge Sider tagget, Stræg. Den er ellers lidet og smal, og opholder sig i Haverne om Sommer-Aftener.
- 51.) *Phalaena Tinea (Trigonella) alis fuscescentibus: macula communi dorsali duplo alba trigona.* No. 266. ? Er ganske lidet, med Folhorne, som paa Hannen ere fierede, paa den indvendige Side alene. Farven er sort-graa og glindsende, med to hvide og trekantede Pletter, som ind-

tager en Deel af begge Vingerne. Den første af dem vender Grundlinien (Basin) hen til Hovedet, den bageste er mindre og adskilt i to Pletter.

- 52.) *Phalæna Tinea* (*Reaumurella*) *antennis longissimis, alis nigris extrorsum deauratis.*
No. 285.? Er ganske sort, dog noget Sølv-farvet derhos. Hohornene ere nok tre gange saa lange som Kroppen, samt omgivne med hvide og meget fine Ringe ved Roden. Lungen er lang og lodden.
- 53.) *Phalæna Tinea* (*Cinctella*) *alis nigris; superioribus fascia linearis argentea transversa.*
Faun. Svec. Edit. II. 1380. Er meget lidet, af sort Farve, med et eneste hvidt Dørbaand over de øverste Vinger. Hovedet er paa Siderne noget hvidt, og Vingerne bagtil ligeledes hvidagtige.
- 54.) *Phalæna Tinea* (*Aurata*) *alis auratis, antennis annulo argenteo.* † Er af middelmaadig Størrelse, med ganske forgyldede Vinger. Hohornene ere maadelig lange og ligeledes forgyldede, med en hvid eller Sølv-farvet Ring hen ved Spidsen. Kroppen graa-agtig og forgyldt.

NEUROPTERA. Næt-Vingedede Ins.

PHRYGANEAE.

55.) Phryganea (Rhombica) alis flavescentibus flexo-compressis, macula rhombea laterali alba. No. 5.? Er liig en Sommerfugl med smale og sammentrykte Vinger; Har ellers et lidet Hoved og lange udstrakte, samt parallel liggende, Folhorne. Vingerne ere sammentrykte og stribede paa langs, men ei nætformige. Ryg-Skioldet spidser for og bag, og er i Midten adskilt ved en Stribe. Fodderne ere ligesom taggede, formedelst de smaa Haar, som sidder derpaa. Maar Overlivets Blod-røde Farve undtages, er den hele Krop, med Vinger, Fodder og Folhorne, rødbrun. En eller flere hvidagtige Pletter sidder og paa de øverste Vinger, men ei altid. See Fig. XVIII.

56.) Phryganea (Nebulosa) nigra, alis incumbentibus, tubcinereo-nebulosis, caudæ setis truncatis. No. 15. Dens Folhorne ere af Længde som Kroppen, og bestaaer af 40. Leder. Dinene sorte, med tre sorte Knoppe imellem. Ryg-Skioldet er sfæfantet, og Bagdelen trind, med to Haar i Rumpen, der strækker sig uden for

Bingerne; De øverste Binger ere smale, næsten plat-liggende, og sammenfiede ligesom de vare kun een, paa øverste Deel nætformige, men nedentil ikke. Farven er paa Hovedet og Overlivet smudsig guul, men ellers mest sort; Bingerne guulagtige. See Fig XIX. Begge disse Insecter opholder sig ved Vandene.

HYMENOPTERA. Skind-Vingedede Insecter.

TENTHREDO.

- 57.) *Tenthredo (Cerasi) antennis septemnodiis, corpore nigro, pedibus luteis.* No. 14. Er kun lidet og af sædvanlig Skabning. Farven er sort, Bingerne ogsaa sorte eller mørke, med en sort Sene i øverste Kant. Hodderne alene ere gule. Hornene have otte Leder, foruden de to Grundleder. Nogen guul Punct paa Skoldet, eller ved Bingerne, er ei observet.
- 58.) *Tenthredo (Atra) antennis septemnodiis: corpore atro, pedibus rufis.* No. 19. Er gan-

ganske sort med guul Overlæbe og Bis-
detang. Ved hver af de to foreste Bins-
gers Rød sidder en lille guul Siribe,
og en hvid Plet ved Røden af de bage-
ste Fodders Laar. Bingernes overste
Kant er rød, indtil den lange og sorte
Kant-Punet. Fodderne røde, men de
overste Laar paa dem alle, og de bas-
geste Forsodder, sorte.

59.) *Tenthredo (Viridis) antennis septemno-
diis, corpore viridi, abdomine supra fuscō.*
No. 20. Er grøn, med en firkantet sort
Plet i Panden. Overlivets og Bag-
delens overste Side sort, Resten grøn.
Andre ere ganske grønne, og Bagdelens
overste Side alene mørk-grøn. Fod-
dernes underste Side grøn, men den
overste sort. Bingernes overste Kant
er og grøn.

60.) *Tenth. (Rosæ) anten. leptemnod. corpore
flavo, costa alarum superiorum longitudi-
nali atra.* No. 21. Er ganske lidet,
med Folhorne bestaaende af elleve Leder,
samt foran lidt tykkere end bagtil. Ho-
vedet og Overlivet sort; Bagdelen guul;
Fodderne ligeledes gule, alene at de bas-
geste Forsodder har nogle sorte Ringe.

Vingerne har en Kull-sort Sene i øverste Kant, som endes med en sort Kant-Punct.

- 61.) Tenthredo (Livid) antennis septemno
diis, corpore atro: abdomine supra infra-
que livido. No. 23. Har i Folhornene,
foruden de to Grundleder, syv Leder,
af hvilke den femte og sjette, eller de to
næst sidste, ere hvide. Overlæben og
Bidetangen er hvid. Ved Bagdelens
Begyndelse sees og to hvide Pletter.
Resten er sort, indtil de fire eller fem
nederste Leder paa Bagdelen, som ere
røde. De to foreste Par Fodders
Skinnebeen og Forsodder ere mesten-
deels brune; Resten sort. See Fig. XX.
Denne har jeg set at parre sig med en
mindre af samme Skabning, og med
hvid Mund og Bidetang, men ganske
sorte Folhorne. Paa hver Side, ved
Bagdelens Begyndelse, sad en hvid
Plet. De fire nederste Leder paa Bag-
delen vare røde, de to efterfølgende ble-
ge i Midten, og de øverste sorte. Neden
under vare de fire sidste Leder ligeledes
røde, men alle de andre blege. Vin-
gerne havde ligesom tvende Kant-Punc-
ter, formedelst en immellemlobende hvid
Plet. De bageste Fodders nederste
Laar

Laar og Skinnebeen vare røde, Skinnebenene og Forsodderne paa de to foreste Par Fodder vare og mestendeels rødbrunne; Resten sort (*).

- 62.) *Tenthredo (Dubia) antennis septemnodiis, annulo albo, corpore toto atro.* † Er Fig. XX. ganske liig, endog i Henseende til dens hvide Pletter og hvide Ring paa de to næstsidste Leder af Holhornene. Men Bagdelen er her ganske sort, og de to foreste Par Fodder brunagtige. Vingerne havde ligesom tvende Kant-Puncter, formedelst en imellemlobende hvid Plet. Dette er vist nok den, Hr. Linnaeus mælder om Faun. Svec. Edit. II. §. 1557., og anseer som en Forskiel i Kionnet fra *Tenthredo livida*. Men da jeg har seet baade Han og Hun af samme, som ovenfor er vist, er det troeligt, at denne, som adskiller sig fra begge, er et eget Species.
- 63.) *Tenthredo (Leucomelas) atria, antennis septemnodiis, abdomine lateribus albo,* sub-
tus

(*) Til andre Tider har jeg fundet denne sidste alene med tre røde Leder midt paa Bagdelen, da de fire oversie og to sidste vare sorte. Fodderne vare mestendeels ganske røde; Resten usorandret.

tus albo-striato. Farven er i Almindelighed sort og hvid; Hovedet hvidt, men Vandens og Dinene sorte. Overlivet har bagtil en hvid Plet, overst oppe to hvide Striber, og paa Siderne er det ligeledes hvidstribet. Bagdelens Sider ere hvide, Resten sort med hvide Kanter paa Bug-Skiellene. Fodderne ere indentil hvide og uidentil sorte; Men de bageste for største Dejen sorte. Størrelsen er middelmaadig.

- 64.) *Tenthredo (Ovata) antennis septemnodiis, corpore atro, thorace supra rufo.* Faun. Svec. Edit. II. §. 1553. Er ganske lidt og tyk, eller ligesom oval af Skabning. Farven er overalt sort, undtagen paa Overlivets øverste og foreste Deel, som er rød. Hovedet og Overlivet ere ellers meget puncterede. Denne, som her er rar, blev af mig fundet paa Aare-Træe.

JCHNEUMON.

- 65.) *Jehneumon (Incubitor) niger, abdomine ferrugineo; apice nigro macula alba, alis hyalinis, antennis fasciatis.* No. 25. Er middelmaadig stor, med en hvid Ring paa Falhornene. Hovedet og Overlivet

vet ere sorte, og Stilken ligeledes; men den Pæres-dannede Bagdeel rod, undtagen de to à tre nederste Veder, der ere sorte, med en fiendelig hvid Punet paa den nederste. Æg-Lægger-Spidsen er rod, men de to andre, som indslutte den, sorte. Hodderne ere røde, undtagen Skinnebenene paa de bageste, der ere sorte og hvidagtige overst oppe (*).

66.)

(*) Dette Insect ligger i en Galla, af Længde som den middelste Leed paa en Finger, og af Skabning som et langagtig ovalt Æg, bestaaende af en tynd, brun og noget lodden, Skorpe eller Skall, hvis ene halve Deel er indent afdeelt i adskillige Rum, der ligne Hvepse-Boliger, men den anden opfyldt med mange brune, tynde, og ligesom i mange Klige sonderklippte, Blade eller Papirer. I hvert Rum sidder en Orm, af Længde som en Naael, der hos syk og næsten oval, med tolv Ringe over Kroppen, men uden Hodder. I den smaleste Ende sees Tegn til Mundens. Farven er hvid. Denne Galla siges at hænge efter et Spind under Lyng-Qviste, og kom mig til Haande om Vinteren 1762, da jeg lagde den i en Æste, og fornam Sommeren efter, midt in Junio, af deraf fremkom 30 Ichneumones, alle af forommedte Skikkelse, uden at jeg kunde merke nogen Forskiel paa Kionnet. Dette observeredes og, at Bagdelen kom først frem, og at Hovedet vendte ned ad, hvor Rummene vare mest smale.

- 66.) *Jehneumon (Leucomelas) scutello flavi-cante: corpore pedibusqve albo-macula-tis.* † Er iblant de største, med hvid Ring paa Fothornene, og i Almindelighed sort og hvid. Over DINENE sidder en hvid Stribe, og under samme en fortære. Overlivets Skildt er hvidt, foruden to hvide Linier der ovenfor, og paa hver Side ved Vingernes Rod to andre, hvortil endnu kommer to hvide Pletter neden for Skildtet. Bag-delen har fem hvide Pletter paa hver Side, saaledes, at de tage af i Størrelse ned ad. Men Stikken og de to sidste Leder ere uden Pletter. Hodderne ere sorte, med adskillige hvide Pletter og Ringe. Ligner *Jchneumon persa-sorius*.
- 67.) *Jchneumon (Maculatorius) scutello flavi-cante; corpore maculato, abdominis seg-mento secundo, qvarto sextoqve luteo, octavo flavo-striato.* † Er middelmaa-dig stor, og har en sort Farve med mange gule Pletter, nemlig to i Panden, to paa Overlivets foreste Deel, een paa Skildtet, een ved hver Vinges Rod, og endnu een langagtig paa hver Side. Stikken er sort, anden, fierde og siette Leed gule; den ottende derimod sort

sort, med tre gule Everstribber. Fodderne ere rødbrune, og Folhornene paa underste Side guulagtige. Ligner Jehneumon luctator & volutator.

- 68.) *Jehneumon (Pastinacæ) torus rufus*, antennis atris fascia alba. † Er lidet, med en meget Pære-dannet Bagdeel. Farven er overalt mørk-rød, undtagen Di-nene, Folhornene og en Deel af det bagste Par Fodder, som ere sorte. Folhornene ere vel saa lange som Kroppen, og har i Midten en hvid Ring. Vingerne ere blanke, med sort Kant-Punct. Findes paa Pastinak, der har staet Vinteren over i Haverne.

DIPTERA. To Vingede Insecter.

TIPULA.

- 69.) *Tipula (Albipes) atra*, pedibus longissimis, apice albis. † Er noget større end *Tipula nigra*, og samme meget liig. Folhornene har tolv Leder, af hvilke den tredie, som sidder de to Grundleder nærmest, er meget lang imod de andre. Kroppen er sort, men Bagdelen noget lysere, fornemmelig paa underste Side. Vingerne ere meget mørke, med en stor sort Kant-Punct, og Fodderne meget lange.

lange. Sammes Farve er sort, men den nederste fierde Deel, eller lidt mere, hvid, som, naar den kommer flyvende, er meget fiendeligt, og strax adskiller den fra alle andre. Den findes ved Elvene.

- 70.) *Tipula (Contaminata) alis nigro-maculatis, corpore nigro.* No. 7. Er af Størelse som *Culex vulgaris*, og overalt sort-graa, med lyse Ringe omkring Bagdelen. Folhornene har forten Leder, foruden de to Grundleder, og Bingerne mange sorte Pletter, nemlig tre i Rader i øverste Kant, af hvilke den ydersste sidder som en sædvanlig Kant-Punct, og er storst. Imellem den og efterfølgende sidder en lille smal og bolgagtig Stræg paa evert, dernæst midt paa Bingen en sort Punct, og endelig een hen ved Bingernes Nod. Fodderne ere noget blegere end Kroppen, og vægt-Stængerne blege.
- 71.) *Tipula (Plumosa) thorace virescente, alis hyalinis puncto nigro.* No. 19. Er større end *Culex vulgaris*, med korte og meget fiere-dannede Folhorne af sort Farve. Kroppen er deels grøn, deels mørk, med lyse Kanter paa Bagdelsens Leder.
Sam-

Samme er ellers lang og smal, med nogen Loddenhed, og hos Hannerne Kloster i Enden. Vingerne ere hvide, med en mørk Plet i Midten, hen ved overste Kant, som foraarsages af sammenlobende mørke Sener.

- 72.) *Tipula (Pinnicornis) antennis bipectinatis, corpore atro, halteribus albis.* No. 37. Er omrent $1\frac{1}{2}$ Linie lang, og har Følhornet, der ere haarede, ligesom en Hestes Rumppe. Hele Kroppen er sort, men Baegt - Stængerne Sneehvide. Vingerne ere lyse. Den flyver om Sommer - Aftener omkring i Mængde, og giver en stærk Lyd eller Sang fra sig.

MUSCA.

- 73.) *Musca (Lappona) antennis plumatis, subtomentosa nigra, scutello ferrugineo, abdomine, cingulis tribus albidis interruptis.* No. 16. Er en temmelig stor Flue med Ficer-dannede Føle-Haar, sort Overliv, brandguul Bag-Spidse eller Skildt (apex) samt hvidagtig Vand. Bagriden er sort, glat og skinnende, med tre Sneehvide Eværlinier, der i Midten ere igennemskarne. Fodderne ere rodbrune, og alene Fodsolerne noget sorte. De foreste Fodders Laar ere og mes
Erb. Selst. Skr. 4. D. 3 sten-

stendeels sorte, og Vingerne brune i overste Kant. Lader sig let fange.

- 74.) *Musca (Mellina) antennis setariis nuda, thorace subaneo fuscescente immaculato, abdomine maculis octo lutescentibus.* No. 43. Er af middelmaadig Størrelse, med rødbrune Øine, sort og glindsende Overliv, og enkelte Fole-Haar. Den tynde og smale Bagdeel er sort, med otte merkelige Pletter af hvid Farve, to og to tvært over for hinanden paa hvert Leed. Fodderne ere i det nederste noget brune, ellers sorte. Den falder og undertiden mindre, alene med sex gule Pletter paa Bagdelen, samt gule Fodder, ellers i alle Ting som hin.

Disse Fluer fiendes ellers af deres soevende Flugt, da de ligesom hænge eller soeve i Luften.

- 75.) *Musca (Pipiens) antennis setariis glabra nigra, abdomine utrinque albo-maculato, femoribus posticis clavatis dentatis.* No. 44. Er den næst foregaaende meget liig i Størrelse og Skabning, har enkelte Fole-Haar, hvidagtig Pande og mørkbrune Øine. Overlivet er sort oven til, men hvidagtigt paa Siderne; Bagdelen aflang og tynd, af sort Farve, med

med tre hvide Pletter paa hver Side. Laarene paa de bageste Fodder ere meget tykke, og paa indvendende Side taggede som en Sav. Alle Fodderne ere sorte, med brune Leder og Ringe.

- 76.) *Musca (Segnis) antennis setariis glabra, thorace æneo, abdomine ferrugineo : apice nigro, femoribus posticis clavatis.* No. 45. Er de tvende foregaaende temmelig liig, men større. Overlivet er kobberfarvet, og den aflange Bagdeel rødbrun i Midten, men oven og nedentil sort. Laarene ere sorte, men alle Skinsnebenene hvide i det øverste. Vingerne ligge tæt ovenpaa hinanden. Den opholder sig i Husene, og sidder som oftest stille.
- 77.) *Musca (Meridiana) antennis plumosis, pilosa nigra, fronte aurata, alis basi luteis.* No. 49. Er nok den største af alle de Fluer her falder, og har Ficer-dannede Føle-Haar. Neden for Øinene er den guul og glindsende, men imellem Øinene sort. Vingerne ere nærmest Kroppen brandgule. Vægt-Stængernes Dækkeskål og Foddernes Fodsoler har samme Farve. Kroppen er sort og skinnende, dog tillige med lange Haar besadt.

78.) *Musca (Rotundata)* antennis setariis pilosa, thorace sublineato, abdomine subrotundo flavo: maculis longitudinalibus fuscis confertis. No. 57. Er en lidet rar Flue, med lange Høle-Knuder og enkelte Høle-Haar. Imellem Dinene sidder to gule Striber, og derimellem igien en rød-agtig Fure. Omkring Hovedet har den en hvidagtig Loddenhed. Overlivet er paa foreste Deel guulskinnende og loddet, med fire mørke Striber ned ad, og et Eær-Skaar over samme. Bagdelen er rund, over og under rødgul, med fire sorte Pletter i Rad ned ad, af hvilke den første er firkantet, men de andre, som hænge fast dermed, trekantede. Vægt-Stængernes Dækkeskiel ere hvide, og Bingerne kunsmaa. See Fig. XXI.

79.) *Musca (Cynipsea)* antennis setariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato. No. 87. Er kun af Størrelse som en Loppe, med et lidet rundt Hoved, blege Dine, hvide Vægt-Stænger, og temmelig lange Fodder. Bagdelen er bagtil tyk, men foran Være-dannet. Bingerne har en sort Kant-Punct hen ved Spidsen, som er meget kendetegnende, og samme holdes idelig i Bes-

i Bevægelse. Hølehaarene ere enkelte, og Farven sort og skinnende. Femora antice dentata har jeg ei fundet hos den. Den opholder sig paa Marken.

- 80.) *Musca (Heraclii) antennis setariis, alis albis: falcis fuscis repandis, oculis viridibus.* No. 96. Er en ganske lidet men smuk Flue, med enkelte Høle-Haar, guul Vande, gule Høle-Knuder og gronne Øine. Overlivet er brunt, med en guul Streng paa hver Side, og guul Bag-Spidse. Bagdelen er brun, Fodderne gule, og Vingerne lyse, med to brune Flammer paa langs.

TABANUS.

- 81.) *Tabanus (Ferrugineus) ferrugineus, thorace fusco, oculis virescentibus.* f. Har et rundt Hoved, og store Øine, som indtager den største Deel af Hovedet, esterladende alene et lidet Rum i Nakken, hvor der sidder tre sorte Knoppe i en Triangel. Munden er en Kisdagtig Snabel, adskilt i Enden ved to Læber; og paa hver Side af samme sidder en Spidse, der væger frem ad, ligesom Snabelen selv ned ad. Høle-Knuderne ere tre runde Knoppe, hvor paa sidder enkelte Høle-Haar. Over-

livet er tykkere end Bagdelen, som er trind, og tager af i Tykkelse ned ad til Stierten, der er forsynet med en krum Knibetang og en hvas imellem siddende Spidse. Men under Stierten sidder to imod hinanden staaende Bladé, hvormed den ligeledes shnes at funne klemme som med en Knibetang. Hunnens Stiert er derimod spids. Farven er paa Dinene oven til rødbrun, men ned til gronagtig. Kroppen og Fodderne ere rødbrune, men Overlivet oven til Sod-farvet. Vingerne ere mørke, med en sort Kant-Punct, og sort Skygge i overste Kant. See Fig XXII.

- 82.) Tabanus (Pubescens) corpore fusco, thoracis lineis tribus dorsalibus atris. † Er af samme Størrelse og Skabning. Henseende til Mund og Hole-Haar er den og ligedan, alene at Hovedet er her stærkt omgivet med en sort Loddenhed. Bagdelen har i Enden to krumme Spidser. Farven er overalt sort-graa, med tre sorte og temmelig brede Striber paa Overlivets Ryg. Vingerne mørke, og ganske lidet brune i overste Kant, hvorfra og sidder en brun og ikke meget Eindelig Kant-Punct.

83.) *Tabanus (Lanatus) fuscus*, alarum puncto marginali atro, pedibus subtestaceis. Er fun lidet mindre, og af samme Skabning. Under Hovedet har den en hvid Loddenhed. Overlivet er paa Siderne lys, men over til mørk-graatt. Den smale og trinde Bagdeel er sort, dog saa, at de overste Led er aiene sorte i Midten og brune paa Siderne. Vingerne ere Vand-farvede og glindsende, med en sort og aflang Kant Punct. Fodderne ere for storste Delen brune, men Laarenes nederste Deel sort. Findes, som de andre, blant Treerne.

APTERA. Vingeløse Insecter.

ACARUS.

84.) *Acarus (Motatorius) pedibus primis longissimis motatoriis. No. 11.* Er ei større end en Gnid, og aflang af Skabning. Paa hver Side af det lille Hoved sidder to fine Folehorne. Af dens otte Par Fodder ere de to forreste ulige længere end de andre, og samme beveges idelig op og ned, ligesom for at føle sig for dermed. Farven er bleg-guil, og dens Tilholdssted alle Slags Jord-Svampe (Fungi) paa Marken.

85.) *Acarus (Holofericus) abdomine depresso
tomentoso, postice retuso, terrestris.*
 No. 19. Er et lidet loddent og hvidt
rodte Insect, alle bekjendt under det
Naon Rød-Luus eller Buste-Luus;
hvorved jeg ikkun vil erindre, at man
holder det for en dodelig Forgift for
alle Slags Creature, som faae den i sig;
Men tillige dette, som det sikkerte Læge-
Middel derimod, at man tager een eller
flere (helst om Foraaret, saasnart den
lader sig tilsynne) og gnier den vel i Styk-
ker imellem Hænderne, hvilke man
siden saa ofte fornoden gisres, toer i
Band, og lader det syge Creatur driske
deraf (*). Hvorvidt dette Raad er pro-
bat,

(*) *Bøye i hans Svenske Landmand, Danske Edit. pag. 331.* melder ei alene om dens For-
giftighed, som noget ganske tilforladeligt, men
giver ogsaa samme Raad derimod, alene med et
andet vehiculum, nemlig først at spytte i Næ-
ven (hvor Insectet forud er vel gnedet) og siden
at bestryge den med et Stykke Sunn-Brod,
som derefter indgives Creaturen. Men endikont
Author ansører dette ester egen Erfarenhed og
med største Forsikring, sga har jeg dog stor Var-
sag at tage i sær det forsie i Tivoli, ligesom jeg
ikke heller ved, hvorledes dette Insect kan kom-
me i Creaturene, da det opholder sig i Jorden.
Jeg tænker da, at det herudi kan have sig som
med

bat, kan jeg ei sige, da jeg ei har forsøgt det; men derimod har jeg nogle gange givet Hunde, samt Haar og smaa Lam, dette Insect et øde, indeeltet i Dei, uden at fornemme hos nogen af dem ringeste Virkning deraf.

- 86.) *Acarus (Fluviatilis) rotundus, albo-fusco-que maculatus, pedibus posticis longioribus.* † Et om trent af Storrelse som et Raal-Hroe, og gandske rund. I Steden for Hoved har den en lille Kant omkring Kroppens forreste Deel, hvorpaa sidder to krumme Hole-Spidser, hvis bageste Deel er tyk, med en lidet Tand paa underste Side, men den forreste smal og spids. Dens fire Par Hodder sidde alle hen ved Kroppens forreste Deel, og af dem ere de bageste de længste. Farven er hvid og brunpietet med temmelig store Pletter, af hvilke tre paa

35 Krop

med de almindelige Skollorme (*Scolopendra pedibus utrinque quindecim*), der vel kan have nogen lægende Kraft hos sig, som Regn-Orme og andre, omendskjont ingen af samme Slags forud vare komne ind i et Creatur, hvilket vel i Almindelighed foregives, men er vanskeligt at komme efter. Dog nægter jeg ikke, at der kan være nogen Forstiel paa at faae et saa stort Insect leveende i sig, og at faae det, naar det er dødt.

Kroppens forreste Deel, og to paa Bagdelen, ere de fiendeligste. Den er alt-saa i Henseende til Farve meget anseelig, og fiendelig endog for blorte Dine. Op-holder sig paa Bunden af Elvene.

ARANEA.

- 87.) Aranea (*Fenestratis*) macula abdominis nigra trigona, cingulo luteo. † Er maadelig stor, med Hole-Fodder, hvilc forreste Leed hos de største er lidet klumpagtig, men hos de mindre (egentlig Hanserne) indhuul som en Skee, og inden i Hulen forsynet med et lidet klumpagtigt Leed, der har sinne Kloer at knibe med. Dinene ere otte, nemlig fire i en Kvadrat, og to paa hver Side deraf. Overlivet er brunt og igienemsigtigt, og Fodderne ligeledes med mørke Ringe. Bagdelen er oval, med en sort, trekantet, og paa Siderne lidt indskaaren eller tagget, Plet, hvilc Grundlinie (basis) vender ned ad. Samme er omgiven med en guulagtig Ring. Resten er mørk og noget pleitet. Fodderne ere temmelig lange, og de forreste de længste. See de største Fig. XXIII. Den er ellers den almindeligste som her sees i Husene, især vinduerne.

- 88.) Aranea (Pinnata) abdomine subgloboso atro, lineis exalbidis pinnatis duabus. † Er lidet, med et brun-agtigt Overliv, der oven til har tre sorte Stræger paa langs. Bagdeelen er rundagtig og tyk, af Farve sort (undertiden mørk-violet) og skinnende som Silke, med to hvide Stræger paa langs, der ere taggede paa Siderne, og foreener sig hen ved Kumpen. Nærmere Bugen har den endnu et Par hvide Stræger paa hver Side, en paa langs og en paa kraads. Fodderne har samme Farve som Overlivet. Den spender sin Bæv over Lyngs- og andre Quiste paa Marken, og sidder altid under sin Bæv med Ryggen nedvendt, hvorför den kunde kaldes Aranea supina.
- 89.) Aranea (Maculata) atra, lineis thoracis lateralibus duabus, punctisqve abdominalis utrinque quatuor albis. † Er kun lidet, og har et Overliv, som er større end Bagdelen. Begge ere sorte og skinnende, det første med en hvid Stræg paa hver Side, det andet med fire hvide Puncter ligeledes paa hver Side, foruden tvende lys-graa Striber nærmere Bugen. Dinene staaer i to Rader paa langs, og dens Fodder har ligesom hvide Ringe.

Ninge. Den findes uden for Huus-Beggene, men sjeldent.

JULUS.

90.) Julius (Complanatus) pedibus utrinque XXX. corpore planiusculo, antennis clavatis. Faun. Svec. Edit. II. §. 2068. Seer ud som en Scolopendra, og er omtrænt af længde som en Nægel paa en Tommelfinger. Høle-Hornene har, foruden Grund-Leden, sex Leder, af hvilke den femte eller næstsidste er klumpagtig, og den alleryderste mindst. Leget med bedækkes oven til af temmelig vidt fra hinanden staaende Skiolde, der ere haardere end Legemet, af Skabning sirkantede, ellers ovenpaa knudrede, og paa Siderne taggede. Det Skold, som sidder Hovedet nærmest, er mest ovalt, men det bageste, som er Sterten, herti-agtigt. Deres Tal er, foruden Hoved- og Stert-Skioldet, sytten, og og for hvert Skold eller Leed af Kroppen, har den to Fodder paa hver Side, nogle saa undtagne, der har kun een, saa deres Tal er i alt 28. paa hver Side. Farven er, oven til brun og skinnende, men neden under og paa Fodderne hvid. Holder til i Jorden.

INTE.

INTESTINA. Orme i Indvolde (*).

HIRUDO.

91.) Hirudo (Plana) corpore plano ovato, anteice emarginato. † Er et Slags langagtig ovale og gandske flade Igler, som opholder sig i Soen. Fortil, hvor Munden sidder, er den indstaaren eller ligesom udgravet, og midt paa Kroppen lidt tykkere end paa Siderne; ellers overalt meget flad og tynd. Paa øverste Side, temmelig langt fra Munden, sidder nogle mørke Punkter i to Samlinger, tvært over for hinanden. Størrelsen eller Længden er som en Nægel paa en Tommelfinger, og Farven brun.

92.)

(*) De fleste af dette Slags Orme trænge sig ind i andre Creaturers Indvolde, og af dem ere adskillige hos os bekendte, saasom: Øveisen (Gordius argillaceus) i Fiskenes Kid og Lever; Orm i Liveret, i sær hos Bjørn (Lumbricus & Ascarides); Igler i Creaturenes, i sær Haarenes, Lever (Fasciola hepatica); Hvortil og kan henvores en Igles eller Fasciola tentaculis quatuor globosis echinatis, som jeg har fundet inden i en Sey, og beskrevet i Søndm. Beskrivelse 1. P. pag. 176.; item Hvid-Malen (Myxine glutinosa) som løber ind i Fiskene og fortærer dem. See loc. cit. pag. 287. saa og det Throndh. Selstabs Skrifter. 2 P. pag. 250.

92.) *Hirudo (Littoralis) depressa grisea, punctis duobus nigris immersis.* † Er af Størrelse omrent som et Risen-Gryn, undtagen naar den strækker sig meget ud. Skabning er den som de sædvanlige Igler. Farven er neden under hvid; men oven til graa, og under Forstørrelsens Glasset tillige lidt spretet. Strax oven for Munden sidder to sorte Puncter i smaa Fordybeller, ligesom Øine. Den findes i stor Mængde blandt Mudder i Stranden om Sommeren, saa den vrimler deraf. I Svenske Acad. Handl. for 1757. sidste Kvartal tre-die Afhandling No. 5. meldes om en ligesaadan skjønt større Igel, med to sorte Puncter oven for Munden. Men da samme opholder sig i det færste Vand, ligesom denne i det salte, kan man ikke med Rimelighed holde dem for eet og samme Species.

MOLLUSCA. Bløde Orme uden Skiel.

APHRODITA.

93.) *Aphrodita (Violacea) oblonga violacea, squamis dorsalibus utrinque quindecim.* † Er aflang, og holder omrent en Tomme i Længde. Under det lille Hoved sidder en temmelig viid Mund, som

som den kan skyde ud og ind, og paa begge Sider deraf to bløde Fole-Traas-de, foruden et Par mindre forpaa Hovedet. Ovenpaa bedækkes Hovedet af en lidt rundagtig Plade, der har tre sorte Puncter paa hver Side. Den hele Krop bedækkes ovenpaa af store Skiel, der sidde i to Rader ned ad, femten i hver Rad, og ere kun faste til Kroppens yderste Side, folgelig meget løse. Neden under er den derimod nogen, eller uden Skiel, og har en Fure i Midten. Paa hver Side har den 34. Fodder, hver bestaaende af en dobbelt Pensel eller Kvast, af hvilke den overste er kortere end den underste. Farven er neden under blaa, men ovenpaa violet-rød, med en guul Plet paa hvert Skiel, hvorefter deres Tal let kan beregnes.

- 94.) *Aphrodita (Squamata) oblonga, dorso squamato lævi.* No. 1. Er langagtig oval, som den foregaaende, og af Længde som en stor Nægel. Foran sidder to noget lange Folehorne, pægende frem ad, tilligemed et andet midt imellem disse, pægende op ad, og endnu to à tre paa hver Side, der ere kortere. Alle ere bløde, men holdes i Søen stive som Bor-

Børster. Oventil bedækkes Kroppen af to Rader ovale Skiel, tolv i hver Rad, alle fastede til Kroppens yderste Side alene. Paa hoer Side har den 24. Korte Fodder forsynede med Quaste i Enden. I Kumpen har den nogle Børster, og paa Bugen en Hure paa langs. Farven er brun, med en hvid-agtig Plet paa hvert Skiel, hvorefter deres Tal uden videre Uimage kan beregnes. Begge disse opholder sig i Søen nær Strandbredden.

TESTASEA. Orme i Skiel.

CHAMA.

95). Chama (Aculeata) testa oblonga, aculeis duplice serie dispositis. † Er en lidet Skiel, med smaa rundagtige Ophoierler (nates) bagtil ved Giengerne, hvor der sidder en stumpet Tand i hver af Skielens Deele. Ryggen ovenfor bemeldte Ophoierler er noget udstaende, og gior Skellen i den Ende bredest. Den anden Side, som jeg vil kalde Maven, (venter) er derimod lidet indsammentrykt og indstaaren, eller Hue-agtig. Den forreste Ende er næsten tvær, og derfra hen til nates gaaer to Rader Tiorner paa begge Skellenes Sider. Samle-

sem disse Diorner er Skellen stribet paa tvært, men ellers paa langs. Den optrækkes med Coraller fra Hav-Bunden, og har en hvidagtig Farve. See Fig. XXIV.

BUCCINUM.

- 96.) *Buccinum (Incrassatum)* testa oblonga, transversim rugosa, longitudinaliter striata, labro intus denticulato, extus incrassato. † Har sex Omdreielser fra venstre til høire Haand, af hvilke de tre øverste ere meget smaa imod de andre. Den har mange ophøjede Striben paa langs, med andre mindre paa tvært. Alabningen er oval, Canalen fort, tilbagebojet, og bagtil dybt indskaaren; Men Kanten (labrum) indentil tandet og udentil ophoyet, folgelig tykkere end det øvrige af Snegel-Huset. Farven er som oftest blaa og rødagtig-spattered. Findes overalt i Strand-Sanden, hvor Havet staar lige ind paa Landet. Ligner meest *Buccinum reticulatum*. See Fig. XXV.
- 97.) *Buccinum (Truncatum)* testa oblonga, longitudinaliter striata, cauda subreflexa, emarginato-truncata. † Er mindre, med sex Omdreielser fra venstre til høire Haand. Den har alene hvasse Striben paa langs, en langagtig Alabning, en tynd Esh. Selsk. Skr. 4. D. Aa Kant,

Kant, og noget tilbagebvier Canal, der til Slutning er ligesom tvært afskaa- ren med en gandstke liden Indskierelse bagtil. Den har en mørk Mudder- agtig Farve, og optrækkes med Coral- ler af Hav-Bunden. See Fig. XXVI.

PATELLA.

- 98.) Patella (Pellucida) testa integerrima obovata gibba pellucida: radiis quatuor caeruleis. No. 673. an? Er en oval Skiel uden Un- der-Deel, indentil indhuul som en Skaal, og uden paa ophoiet eller convex, dog saaledes, at den foreste og bredeste Ende fal- der mere skraa, men den anden mere tvæ- og Pukkel-agtig. Den har ellers en mørk Horn-Farve, med henved tolv fine Straaler eller Linier paa langs, af høie- ste blaa og skinnende Farve, saa man intet kan forestille sig smukkere. Men naar man undtager fire å sem af de mid- delste Linier, som ere hele, ere alle de andre nogle gange afbrudte og usuld- komne. Af Størrelse ere de som de største Hassel-Mødder, og ellers igien- nemsigtige som tyndt Horn. Nogle har jeg, som ere mindre, og af en hvid igienemsiglig Horn-Farve, hvorpaa de blaa Linier neppe ere kiendelige. Alle findes i Strand-Sanden. Ellers har jeg og seet et Par meget smaa af dette

dette Slags, siddende paa Kurve-Tærins Blad, med syv blaa og skinnende Straaler, hvorfaf ingen var heel, men alle afbrudte.

- 99.) *Patella (Testudinaria) testa integerrima ovata* lævi glaberrima. No. 674. Falder her mindre, og er af samme Skabning, naar dens øverste Pukkel undtages, der er lidt mere spids. Den har mange fine Straaler paa langs, der knap kan adskilles med blottie Øine, og udentil en adskillig samt meget pletter, Farve; Men indentil er Farven gierne grøn. Den findes ellers siddende paa allehaande Skiel i Søen, og er en af de almindeligste.
- 100.) *Patella (Fissura) testa ovali striato-reticulata, vertice recurvo, antice fissa.* No. 681. Er endnu mindre, men mere ophviet, med en nedbojet Spidse i det øverste. Rundt om har den 24. dybe Striber eller Straaler, som i Kanten gisr den tagged; og foran sidder en fin Risse eller Sprekke. Den er ellers tynd, igiensigtig og af mørk Farve. Oprækkes med Coraller og andet af Havets Bund.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.



Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.



Fig. 19.



Fig. 20.



Fig. 21.



Fig. 24.



Fig. 25.



Fig. 26.

