

TRØNDELAGENS LANDSNEGLER

AF

FRIDTHJOF ØKLAND

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SKRIFTER 1915. NR. 5

AKTIETRYKKERIET I TRONDHJEM
1916

Trøndelagens landsnegler.

Hr. konservator NORDGAARD opfordret mig i sommer til at offentliggjøre en fortægnelse over de landsnegler jeg hadde indsamlet under et par dages ophold paa Frosta (et par mil fra Trondhjem). Han mente at en slik oversigt kunde ha interesse, selv om fortægnelsen selvfølgelig ikke kan gjøre krav paa at være fuldstændig. Indsamlingen blev foretaget i løbet av tre dager, og paa den tid kan man jo vanskelig gjøre sig haab om at finde stort mere end hvad der saa omtrent svarer til de almindeligste arter.

Men nu er der jo ogsaa tidligere samlet en del pulmonater i Trøndelagen, og paa grundlag av litteratur har prof. O. SARS i »Bidrag til kundskapen om Norges arktiske fauna» (1878) git en liste over de indtil da fundne arter, under tabellernes rubrik «Norv. media (Trondhjem)». Ved at sammenstille denne fortægnelse med de arter jeg selv har fundet skulde man faa et nogenlunde fuldstændig billede av Trøndelagens landsneglefauna. Den første af de følgende lister indeholder de arter jeg fandt paa Frosta, den anden de arter SARS opfører. Arter fælles for begge er sat paa samme linje.

Landsnegler

fundet paa Frosta sommeren
1915 av FRIDTHJOF ØKLAND:

Limax cinereo-niger, WOLF.

L. arborum,

BOUCHARD CHANTEREAUX.

Agriolimax agrestis, LIN.

Vitrina pellucida, MÜLL.

Conulus fulvus, MÜLL.

Vitreola crystallina, MÜLL.

Hyalinia cellaria, MÜLL. (?)

H. radiatula, ALDER

var. *petronella*, CHARP. (?)

opført fra Trøndelagen av
prof. dr. G. O. SARS.

Limas increus, LIST.

Vitrina pellucida, MÜLL.

Petasia fulva, MÜLL.

Zonites nitidula, DRP.

Z. hammonis, STRØM.

Z. petronella, CHARP.

Arion subfuscus, DRP.
A. circumscriptus, JOHNSTON
Punctum pygmæum, DRP.
Pyramidula ruderata, STUD.
Vallonia pulchella, MÜLL.
var. *costata*, MÜLL.
Hygromia hispida, LIN.
Helicigona arbustorum, LIN.
Helix hortensis, MÜLL.
Clausilia laminata, MTG.
Cl. bidentata, STRØM
Vertigo pygmæa, DRP. (?)
Pupilla muscorum, LIN.
Sphyradium edentulum, DRP.

Cochlicopa lubrica, MÜLL.

Arion ater, LIN.
A. subfuscus, DRAP.

Discus pygmæus, DRP.
D. ruderatus, STUD.

Hygromia hispida, LIN.
Arionta arbustorum, LIN.
Helicogena hortensis, MÜLL.
Clausilia laminata, MTG.
Cl. bidentata, STRØM

Pupa muscorum, LIN.
Vertigo edentula, DRP.
Pupa columella, BENZ.
Discus harpa, SAY.
Cochlicopa lubrica, MÜLL.
Balea perversa, LIN.
Succinea putris, LIN.
S. arenaria, BOURCH.

Av de egentlige landsnegler (stylommatophore pulmonater) er der altsaa i Trøndelagen fundet ca. 30 arter. Nu er det vel temmelig sikkert, at den ovenfor anførte kombinerede fortegnelse ikke er helt fuldstændig, men man kan gaa' ut fra at de manglende arter for det første er ganske faa, og for det andet mindre hyppig forekommende.